

Juhairiyah NIM : 16153010015 Program Studi DIV Kebidanan	Dosen Pembimbing Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns, M.Kep NIDN. 0723058002
--	--

**HUBUNGAN STATUS GIZI DAN PEMBERIAN MP-ASI DINI DENGAN
KEJADIAN DIARE PADA BAYI USIA 6-12 BULAN**

(Studi di BPM Siti Hotijah, S.ST.,MM.Kes Bangkalan)

ABSTRAK

Diare merupakan gangguan buang air besar (BAB) lebih dari 3 kali dalam sehari dengan konsistensi tinja cair, dapat disertai dengan lendir. Biasanya terjadi karena faktor infeksi, malabsorpsi, faktor makanan dan personal hygiene, bayi yang mengalami diare. Berdasarkan hasil studi pendahuluan didapatkan 101 pada bayi berusia 6-12 bulan yang mengalami diare 54 responden. Tujuan penelitian yaitu Menganalisis hubungan status gizi pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare pada anak usia 6-12 Bulan di BPM Siti Hotijah, S.ST.,MM.kes Kab Bangkalan.

Desain penelitian Analitik dengan pendekatan case control, variabel Independen yaitu status gizi dan MP-ASI dan variabel dependennya adalah Diare. Populasinya sebanyak 54 bayi dengan sampel 50 responden menggunakan tehnik simple Random sampling, dengan lama penelitian Februari-Maret. uji statistik menggunakan Chi square instrument penelitian menggunakan kusioner dan KMS. Penelitian ini sudah di uji etik oleh tim KEPK STIKes Ngudia Husada Madura.

Hasil penelitian menunjukkan Diare dengan dengan Status Gizi sebanyak 17 (52,8 %) diperoleh ($p \text{ value} = 0,002 < \alpha = 0,05$). Maka H_0 ditolak yang berarti ada hubungan antara Status Gizi dengan kejadian Diar. Hasil penelitian menunjukkan Diare dengan dengan MP-ASI sebanyak 17 (52,8 %) diperoleh ($p \text{ value} = 0,000 < \alpha = 0,05$). Maka H_0 ditolak yang berarti ada hubungan antara MP-ASI dengan kejadian Diar

untuk mencegah terjadinya diare pada bayi yaitu dengan pemberian ASI minimal 6 bulan atau yang disebut ASI Eksklusif dan memperhatikan nutrisi bayi dengan cara memberikan MP-ASI setelah usia 6 bulan.

Kata Kunci : Status Gizi, MP-ASI dan Diare