

Husniya
NIM: 170154010027
DIII Kebidanan

Pembimbing
Lelly Aprilia Vidayati, S.SiT, M.Kes
NIDN: 0729048401

**PENATALAKSANAAN BENGGAK KEMERAHAN PADA
PASCA IMUNISASI PENTAVALEN DI POLINDES
SITI KOMARIYAH Amd, Keb KLAMPIS
BANGKALAN**

ABSTRAK

Benggak kemerahan pasca imunisasi pentavalen merupakan suatu reaksi lokal yang terjadi pada bayi pasca imunisasi pentavalen. Benggak kemerahan pasca imunisasi pentavalen disebabkan oleh reaksi suntikan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tiga bulang terakhir (Juli s/d September 2019) sebanyak 4 dari 20 bayi (20%) yang diimunisasi mengalami benggak kemerahan. Tujuan penelitian untuk menganalisis asuhan kebidanan Penatalaksanaan Benggak Kemerahan Pada Bayi Pasca Imunisasi Pentavalen di Polindes Siti Komariyah, Amd. Keb Desa Kelampis Kab. Bangkalan.

Metode penelitian dengan pendekatan studi kasus. Dilakukan Polindes Siti Komariyah, Amd. Keb Kelampis Bangkalan bulan Desember 2019, dengan 2 partisipan yang mengalami benggak kemerahan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi dari keluarga dan tenaga kesehatan dengan analisis menggunakan *conten analisis*.

Hasil penelitian di dapatkan keluhan kedua partisipan yaitu benggak kemerahan pada area bekas suntikan. Pada saat observasi hari pertama ditemukan benggak kemerahan pada kedua partisipan setelah di berikannya imunisasi pentavalen 1. Berdasarkan hasil data subyektif dan data obyektif kedua bayi partisipan di diagnosa benggak kemerahan pasca imunisasi pentavalen 1. Masalah potensialnya tidak ada karena benggak kemerahan yang dialami kedua bayi partisipan masih dalam batas normal. Intervensi tindakan pada kedua partisipan sama yaitu Observasi keadaan umum bayi dan tanda-tanda vital bayi, menganjurkan kepada ibu untuk mengompres berkas suntikan dengan air hangat selama 10-20 menit, dan Memberikan HE tentang kompres. Masalah partisipan teratasi di kunjungan ke 3.

Diharapkan bidan dapat melakukan perannya dalam penatalaksanaan benggak kemerahan pasca imunisasi pentavalen dengan melakukan kompres hangat pada paha selama 10-20 menit.

Kata kunci: Bayi, Benggak Kemerahan Pasca Imunisasi, Pentavalen